



Mourisco branco

Vass7R04s301-305



Collection Vassal-Montpellier

OMtp753

FR 4 x 301-305
Mourisco branco
OMtp 753

OMtp753

Date : 2014
Personne :
Nb feuille :

Manteudo

Mourisco branco

Vass7R04s301-305







EMPLACEMENT. 7 R4 1301. 305

Couche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2												
3												
4												
5	2	23,2	27,2 *	0		<p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> : <i>forte</i> </p>						
						<p> <i>D de 27,2, 35 (-18)</i> </p>						

Formulaire description 4 / 8 (nouaison-véraison)		Emplacement <i>7R4 s301-305</i>
Nom variété / introduction <i>L Mouisco blanco</i>		Remarques <i>Mildiou</i>
Observateur - Date <i>CM 31/7/2018</i>	Code var / intro <i>OMtp753</i>	

LIMBE						
Code OIV	Descripteur	1	3	5	7	9
065 = 17	Taille du limbe	très petite	petite	<u>moyenne</u>	grande	très grande
067 = 18	Forme du limbe	1-cordiforme	2-cunéiforme	3-pentagon.	<u>4-orbicul.</u>	5-rénif.
068 = 20	Nombre de lobes	1-F. entière	2-trois	<u>3-cinq</u>	4-sept	5- + de sept
069	Couleur face supérieure limbe		vert clair	<u>vert moyen</u>	vert foncé	
070 = 27	Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face supérieure du limbe	1- nulle	2- seulement au point pétiole	<u>3- jusqu'à 1^{ère} bifurc.</u>	4- - jusqu'à 2 ^{ème} bifurc.	5- - au-delà de la 2 ^{ème} bifurc
071	Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face inférieure du limbe	1- nulle	2- seulement au point pétiole	3- jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- - jusqu'à 2 ^{ème} bifurc.	5- - au-delà de la 2 ^{ème} bifurc
074	Profil du limbe	1-plan	2-en V	<u>3-involuté</u>	4-révoluté	5-tourmenté
073	Ondulation du limbe (entre nervures I ou II)	<u>absente</u>				présente
072	Gaufre du limbe (dépression entre nervures I et II)	absente ou t. fb.	<u>faible</u>	moyenne	forte	très forte
075 = 19	Cloûre de la face sup. du limbe (entre nerv. dernier ordre)	nulle à t. fb.	<u>faible</u>	moyenne	forte	très forte
084 = 28	Densité p. couchés entre nerv. face inf.	nulle à t. fb.	faible	<u>moyenne</u>	<u>forte</u>	très forte
085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
086	Densité p. couchés des nerv. face inf.	nulle à t. fb.	<u>faible</u>	moyenne	forte	très forte
087 = 29	Densité p. dressés des nerv. face inf.	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
088	Villosité couchée nerv.principales face sup	<u>absente</u>				présente
089	Villosité dressée nerv. principales face sup	<u>absente</u>				présente
000-44	Densité p. couchés limbe face sup.	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
000-45	Densité p. dressés limbe face sup.	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte

PETIOLE						
090	Densité poils couchés sur le pétiole	nulle à t. fb.	<u>faible</u>	moyenne	forte	très forte
091	Densité poils dressés sur le pétiole	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
093 = 30	Longueur pétiole p/r nervure médiane	<u>plus court</u>	légér. plus court	égal	légér. plus long	plus long
000-06	Couleur du pétiole	1- coloré	2- partiel. coloré	<u>3- vert</u>		

SINUS PETIOLAIRE (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7)						
079 = (23)	Degré d'ouverture/chevauchement du sinus pétiole	très ouvert	<u>ouvert</u>	fermé	chevauchant	très chev.
	+ocvv	<u>très larg. ouvert</u>	<u>demi-ouvert</u>	<u>peu ouvert</u>	<u>légér. chev.</u>	<u>très fort. chev</u>
080	Forme de la base du sinus pétiole	1- en U	2- en accolade	<u>3- en V</u>		
081-1	Dent dans la sinus pétiole	absents				<u>présents</u>
081-2	Base du sinus pétiole limité par la nervure	<u>1- non limité</u>	2- sur un côté	3- sur les deux côtés		

SINUS LATÉRAUX SUPÉRIEURS (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7)						
082 = (22)	Degré d'ouverture/chevauchement des sinus latéraux supérieurs	<u>1- ouverts</u>	2- fermés	3- légèrement chevauchants	4- très chevauchants	5- absence de sinus
094 = 21	Profondeur des sinus latéraux supérieurs	absence ou très peu profond	<u>peu profond</u>	<u>moyens</u>	profonds	très profonds
083-1	Forme de la base des sinus latéraux supérieurs	1- en U	2- en accolade	<u>3- en V</u>		
083-2	Dent dans les sinus latéraux supérieurs	<u>absentes</u>				présents

DENTS (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7)						
076 = 26	Forme des dents	1- à deux côtés concaves	2- à deux côtés rectilignes	3- à deux côtés convexes	4- un c. concaves, un c. convexes	5- mélange notation 2 et notation 3
077 = ((24))	Taille des dents par rapport à la taille du limbe	très petites	petites	<u>moyennes</u>	grandes	très grandes
078 = 25	Longueur des dents par rapport à leur largeur	très courtes	courtes	<u>moyennes</u>	longues	très longues

AUTRE CARACTERE OBSERVABLE A CETTE PERIODE						
Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	très faible (<10%)	faible (11-30%)	moyen (31-50%)	élevé (51-70%)	très élevé (>80%)
303 = 31	Epoque de début de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive

INRA Vassal	Virus ENR	Mildiou	F = 5, I = 7	Esca	Chlorose
Codes OIV 2009	Virus CN	Oïdium		Eutypiose	Carence Mg 5
(= OCVV 2013)	Autre	Botrytis		Excrosiose	Autre
Codes 000-internes					